



Translated: January 2026

مرض الزُّهري

- الزهري هو مرض منقول جنسيًا يمكن أن يكون خطيرًا جدًا إذا تُرك دون علاج.
- الكثير من الناس يكون لديهم أعراض خفيفة أو معدومة وتستمر لبضعة أيام فقط.
- يمكن علاج الزهري بالمضادات الحيوية.

الزهري هو عدوى جنسية خطيرة جدًا يمكن أن تؤثر على الدماغ وأعضاء أخرى. يحدث بسبب الإصابة ببكتيريا اللولبية الشاحبة.

يمكن الشفاء من الزهري بسهولة إذا تم تشخيصه مبكرًا.

يمكن أن يكون الزهري خطيرًا جدًا أثناء الحمل. إذا كانت المرأة الحامل مصابة بالزهري، فقد ينتقل إلى طفلها ويعرض حياته للخطر. اقرأ المزيد عن [مرض الزهري أثناء الحمل](#).

كيف تُصاب بالزهري

ينتقل الزهري من شخص إلى آخر أثناء النشاط الجنسي.

ينتقل عن طريق الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي غير المحمي.

يمكن أن ينتقل أيضًا من خلال التلامس الحميم أو الجلدي مع شخص مصاب.

يمكن للأم المصابة أيضًا نقل الزهري إلى طفلها عبر المشيمة أثناء الحمل، وهو ما يسمى الزُّهري الخُلقي. اقرأ المزيد عن [مرض الزهري أثناء الحمل](#).

ما هي العلامات والأعراض؟

العلامات الأولى للزهري لا تدوم طويلًا، لذا يمكنك أن تصاب به وتنقله دون أن تدري.

قرحة (القرحة الصلبة)

بعض الأشخاص يصابون بقرحة حول المنطقة التناسلية أو الفم، بعد 3 إلى 12 أسبوعًا من العدوى.

القرحة:

• عادةً ما تكون غير مؤلمة (لذا قد لا تلاحظها).

• عادةً لا تنزف

• غالبًا ما تشعر وكأنها زر صلب على الجلد

إذا لم يُعالج، تلتئم القرحة وتختفي بعد بضعة أسابيع – لكنك لا تزال مصابًا بالعدوى، وتكون البكتيريا سارية في مجرى الدم وتنتشر في الجسم. تسمى هذه المرحلة الأولية للمرض.

أعراض أخرى

إذا لم يُعالج الزهري، قد تظهر أعراض أخرى بعد 2 إلى 6 أشهر من الإصابة. هذه هي المرحلة الثانوية، والتي قد تستمر لمدة 6 أشهر أو أكثر.

قد تشمل الأعراض:

• طفح جلدي (على الوجه والجسم والذراعين والساقين وراحتي اليدين وباطن القدمين)

• تساقط الشعر

• تورم الغدد

• حمى

• صداع

• ألم في العظام والمفاصل والعضلات

• كتل في أعلى الفخذ (المنطقة الإربية) وحول فتحة الشرج أو الفرج.

بدون علاج، هناك مرحلة كامنة لا تظهر فيها علامات واضحة لكنك لا تزال معديًا.

ستختفي الأعراض، لكن إذا لم يُعالج الزهري سيظل في الجسم ويمكن أن تنقله إلى أشخاص آخرين عن طريق الجنس لمدة تصل إلى سنتين. كما يمكن أن يسبب لك الإعياء الشديد.

إذا كنت تعاني من الزهري غير المعالج لأكثر من سنتين (تسمى المرحلة الثالثة)، يمكن أن يؤثر المرض على الدماغ والقلب والأوعية الدموية الكبيرة والحبل الشوكي والجلد والعظام. وهذا قد يؤدي إلى الإعاقة والوفاة.

الزهري أثناء الحمل

إذا كانت الحامل مصابة بالزهري، فقد ينتقل إلى الطفل ويعرض حياته للخطر. هذا ما يسمى الزهري الخُلقي.

إذا تم اكتشاف الزهري في وقت مبكر من الحمل، يمكن علاجه، مما يقلل من الضرر الذي يلحق بالجنين.

يجب على الحوامل إجراء اختبارات فحص الزهري مبكرًا وبشكل متكرر طوال فترة الحمل.

اقرأ المزيد عن [مرض الزهري أثناء الحمل](#).

كيف أعرف إذا كنت مصابًا بالزهري

اطلب إجراء اختبار فحص دم للزهري

سيجري الطبيب فحص دم للزهري. ومع ذلك، فخلال الفترة القصيرة التي تلي دخول الزهري الجسم، لا يمكن اكتشافه بالفحص. لذا إذا كانت النتيجة سلبية، ستحتاج إلى إجراء الفحص مرة أخرى بعد 3 أشهر.

يعد من الجيد إجراء اختبار للأمراض المنقولة جنسيًا الأخرى مثل [الكلاميديا \(داء المتدثرات\)](#) و [السيلان](#) و [فيروس نقص المناعة البشرية](#) في نفس الوقت.

[\(الموقع الخارجي\)](#). ابحث [Get the Facts](#) ابحث عن خدمة يمكنك من خلالها إجراء اختبار دم للزهري على موقع عن موقع محدد واختر خيار 'الصحة الجنسية / الحمل / الجنسانية'.

كيف يتم علاج الزهري؟

علاج الزهري

يُعالج الزهري بالبنسلين أو مضادات حيوية أخرى. يجب أن تأخذ الدورة العلاجية كاملة وتحضر جميع المواعيد. بعد العلاج، ستحتاج إلى إجراء فحص دم للتأكد من الشفاء.

إذا تُرك دون علاج

إذا كنت تعاني من الزهري لأكثر من سنتين ولم تتلقَ علاجًا، فقد يؤثر على:

- الدماغ
- القلب
- الأوعية الدموية الكبيرة
- النخاع الشوكي
- الجلد
- العظام.

وهذا قد يؤدي إلى الإعاقة والوفاة.

بينما أنت مصاب بالعدوى

بمجرد تأكيد التشخيص، لا تمارس الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي، حتى باستخدام الواقي الذكري، إلى أن تكمل دورة العلاج الكاملة. الزهري معدٍ جدًا، خاصة في المراحل الأولية والثانوية.

تتبع المُخالطين

يجب على الطبيب أيضًا أن يتحدث معك عن تتبع المُخالطين.

إذا كانت النتائج إيجابية للزهري، من المهم إبلاغ الشركاء الجنسيين. وذلك لضمان عدم تأثير الزهري على صحتهم واستمرار الانتشار. إذا لم يتلقَ الشركاء الجنسيون المعتادون العلاج، فقد تُصاب بالزهري مرة أخرى.

تتبع المخالطين يتضمن العثور على مخالطين وإبلاغ جهات الاتصال للشخص المصاب بعدوى حتى يتمكنوا من الحصول على الاستشارة وإجراء الفحوصات والعلاج إذا لزم الأمر. يمكنك القيام بتتبع المخالطين بنفسك و/أو (موقع خارجي) Better To Know بمساعدة مختص صحي. ناقش هذا مع الطبيب. يمكنك أيضًا استخدام موقع لإبلاغ الشركاء الجنسيين دون استخدام اسمك.

كيف يمكن الوقاية من الزهري؟

- أجري فحوصات منتظمة للأمراض المنقولة جنسيًا.
- استخدم دائمًا الواقيات الذكرية و/أو الحواجز المانعة والمزلق المائي عند ممارسة الجنس.
- تحدّث مع الشركاء الجنسيين عن الصحة الجنسية.

من أين تحصل على المساعدة

- راجع الطبيب (الطبيب العام)
- على الرقم 1800 022 222 healthdirect اتصل بخط
 - اتصل بخط المساعدة للصحة الجنسية
 - المتصلون من العاصمة: 9227 6178 (08)
 - المتصلون من الريف: 1800 198 205
- للحصول على معلومات واختبارات مجانية عبر [Healthysexual external site](#) تفضل بزيارة [موقع](#) الإنترنت لداء الكلاميديا (المتدثرات) والسيلان
- تواصل مع [عيادة الصحة الجنسية المحلية \(الموقع الخارجي\)](#)

This document can be made available in alternative formats on request for a person with disability.

Copyright to this material is vested in the State of Western Australia unless otherwise indicated. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the provisions of the Copyright Act 1968, no part may be reproduced or re-used for any purposes whatsoever without written permission of the State of Western Australia.

health.wa.gov.au

Classification: Official