



Translated: January 2026

梅毒

- 梅毒 (Syphilis) 是一种性传播感染 (STI)，如果不进行治疗，可能会导致重症。
- 许多人症状轻微或没有症状，且仅持续几天。
- 梅毒可以通过抗生素来治愈。

梅毒是一种非常严重的性传播感染 (STI)，会影响您的大脑和其他器官。它是由梅毒螺旋体细菌 (Treponema pallidum bacteria) 引起的。

如果尽早确诊，梅毒很容易治愈。

梅毒在孕期可能会非常危险。如果孕妇患有梅毒，可能会传染给她的宝宝，并危及宝宝的生命。请阅读更多关于[妊娠期梅毒](#)的信息。

梅毒是如何感染的？

梅毒是在进行性行为期间从一方传给另一方的。

它可以通过未做防护的阴道性交、肛交和口交传播。

它也可以通过与感染者的亲密接触或皮肤接触来传播。

感染梅毒的孕妇在怀孕期间也可以通过胎盘将梅毒传染给她的宝宝，这被称为先天性梅毒。请阅读更多关于[妊娠期梅毒](#)的信息。

梅毒有哪些体征和症状？

梅毒的初期症状持续时间不长，因此您可能在不知情的情况下被感染并传播给他人。

疮或溃疡 (硬下疳)

有些人在感染后的 3 到 12 周内，生殖器部位或口腔周围会出现溃疡或疮。

此类疮通常具有以下特点：

- 通常无痛 (因此您可能不会注意到它)。
- 通常不会出血

- 通常感觉像皮肤上的一个硬纽扣

如果不治疗，疮会在几周后愈合并消失——但您仍处于感染状态，细菌已进入血液并在全身扩散。这被称为疾病的初期阶段。

其他症状

如果梅毒未经治疗，感染后 2 到 6 个月内可能会出现更多症状。这被称为二期阶段，可持续 6 个月或更长时间。

届时可能出现以下症状：

- 皮疹（出现在面部、身体、手臂、腿部、手掌和脚底）
- 脱发
- 淋巴结肿大
- 发烧
- 头痛
- 骨骼、关节和肌肉疼痛
- 腹股沟、肛门（肛周）或外阴周围出现肿块。

如果不治疗，梅毒会进入潜伏期，在此期间将没有明显症状，但您仍然具有传染性。

虽然症状会消失，但如果未经治疗，梅毒就会留在您的体内，在之后的 2 年内，您可能会通过性行为而将其传播给他人。它还会发展为重症。

如果未经治疗梅毒超过 2 年（称为三期阶段），疾病会影响大脑、心脏、大血管、脊髓、皮肤和骨骼。这可能导致残障和死亡。

妊娠期梅毒

如果孕妇患有梅毒，可能会将其传染给婴儿并危及婴儿的生命。这被称为先天性梅毒。

如果在怀孕早期发现梅毒，是可以治疗的，从而减少对婴儿的伤害。

孕妇应在怀孕早期进行梅毒检测，并在整个孕期接受多次重复检测。

请阅读更多关于[妊娠期梅毒](#)的信息。

我如何了解自己是否感染了梅毒？

要求进行梅毒血液检测

医生会对您进行梅毒血液检测。然而，梅毒入侵身体后的短时间内，可能无法通过检测发现。因此，如果您的检测结果为阴性，则需要 3 个月后再进行检测。

最好同时也进行其他性传播感染（STI）的检测，例如[衣原体](#)、[淋病](#)和[艾滋病毒](#)。

您可以在 [Get the Facts \(外部网站\)](#) 上查找提供梅毒血液检测的服务机构。通过输入邮编或地区，并勾选“Sexual Health / Pregnancy / Sexuality”（性健康/怀孕/性行为）选项来进行搜索。

如何治疗梅毒？

梅毒的治疗方法

梅毒可以用青霉素或其他抗生素进行治疗。您需要完成整个疗程并确保按时赴诊。

治疗后，您需要进行血液检测以确保自己已痊愈。

如果不治疗会有什么后果

如果您患梅毒超过 2 年且未接受治疗，它可能会影响您的：

- 大脑
- 心脏
- 大血管
- 脊髓
- 皮肤
- 骨骼。

这可能导致残障和死亡。

在您感染期间

一旦确诊，在您完成整个疗程之前，请勿进行阴道性交、肛交或口交，即使用了安全套也不行。梅毒传染性很强，尤其是在一期和二期阶段。

接触者追踪

您的医生也应该与您讨论接触者追踪事宜。

如果您梅毒检测呈阳性，请务必通知您的性伙伴。这是为了确保梅毒不会影响他们的健康，也不会继续传播。如果经常与您发生性行为的性伙伴未接受治疗，您可能会再次感染梅毒。

接触者追踪是指找到并告知感染者接触过的人，以便他们在必要时获得心理咨询、检测和治疗。您可以自行进行接触者追踪，和/或在医疗专业人士的帮助下进行追踪。请与您的医生讨论该事宜。您还可以使用 [Better To Know 网站 \(外部网站\)](#)，匿名通知您的性伙伴。

如何预防梅毒？

- 定期进行性传播感染检测。
- 发生性行为时始终使用安全套和/或口腔保护膜、以及水基润滑剂。

- 与您的性伙伴讨论性健康的问题。

可以去哪里寻求帮助

- 咨询您的全科医生 (GP)
- 致电 *healthdirect*: 1800 022 222
- 致电性健康热线 (Sexual Health Helpline)
 - 城市地区: (08) 9227 6178
 - 乡村地区: 1800 198 205
- 访问 [Healthysexual \(外部网站\)](#) , 获取信息以及免费的在线衣原体和淋病检测
- 联系您当地的[性健康诊所 \(外部网站\)](#)

This document can be made available in alternative formats on request for a person with disability.

© Department of Health 2025

Copyright to this material is vested in the State of Western Australia unless otherwise indicated. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the provisions of the Copyright Act 1968, no part may be reproduced or re-used for any purposes whatsoever without written permission of the State of Western Australia.

health.wa.gov.au

Classification: Official