



Translated: January 2026

ซิฟิลิส

- โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจร้ายแรงมากหากไม่ได้รับการรักษา
- หลายคนมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการเลย และอาการจะหายไปภายในไม่กี่วัน
- โรคซิฟิลิสสามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ

โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ร้ายแรงมาก ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสมองและอวัยวะอื่น ๆ ได้ โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทรีโพเนมาพาลลิเดียม (*Treponema pallidum*)

โรคซิฟิลิสรักษาให้หายได้ง่ายหากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก

โรคซิฟิลิสเป็นอันตรายอย่างมากต่อหญิงตั้งครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์เป็นโรคซิฟิลิส โรคนี้สามารถแพร่ไปสู่ทารกในครรภ์และเป็นอันตรายต่อชีวิตของทารกได้
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [โรคซิฟิลิสในระหว่างตั้งครรภ์](#)

โรคซิฟิลิสติดต่อได้อย่างไร

โรคซิฟิลิสติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งผ่านทางกรรมมีเพศสัมพันธ์

โรคนี้แพร่กระจายโดยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก และทางปากโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

โรคนี้ยังสามารถแพร่กระจายได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดหรือการสัมผัสผิวหนังกับผู้ติดเชื้อ

แม่ที่ติดเชื้อสามารถถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิสไปยังลูกได้ผ่านทางรกในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งเรียกว่าซิฟิลิสแต่กำเนิด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [โรคซิฟิลิสในระหว่างตั้งครรภ์](#)

อาการและสัญญาณของโรคมีอะไรบ้าง

อาการเริ่มต้นของโรคซิฟิลิสจะไม่คงอยู่นาน ดังนั้น คุณอาจเป็นโรคนี้ และแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว

แผลหรือแผลเปื่อย (แผลริมฝีปาก)

บางคนอาจมีแผลหรือรอยแดงบริเวณอวัยวะเพศหรือในปาก ภายใน 3 ถึง 12 สัปดาห์หลังจากการติดเชื้อ

แผล:

- โดยปกติแล้วจะไม่เจ็บปวด (ดังนั้น คุณอาจไม่รู้สึกรู้ตัว)
- โดยปกติแล้วจะไม่ออก
- มักรู้สึกเหมือนกดปุ่มแข็ง ๆ บนผิวหนัง

หากไม่ได้รับการรักษา แผลจะหายและจางลงในไม่กี่สัปดาห์ แต่คุณยังคงติดเชื้ออยู่ และแบคทีเรียยังคงอยู่ในกระแสเลือดและแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย นี้เรียกว่า ระยะเริ่มต้นของโรค

อาการอื่น ๆ

หากไม่ได้รับการรักษา โรคซิฟิลิสอาจมีอาการอื่น ๆ ปรากฏขึ้นภายใน 2-6 เดือนหลังจากติดเชื้อ
นี่คือระยะที่สอง ซึ่งอาจกินเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น

อาการอาจรวมถึง

- ผื่นขึ้นตามผิวหนัง (บริเวณใบหน้า ลำตัว แขน ขา ฝ่ามือ และฝ่าเท้า)
- ผมรั้ง
- ต่อมมน้ำเหลืองบวม
- เป็นไข้
- ปวดศีรษะ
- อาการปวดกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ
- มีก้อนเนื้อบริเวณขาหนีบและรอบ ๆ ทวารหนักหรือช่องคลอด

หากไม่ได้รับการรักษา จะเกิดระยะแฝงซึ่งไม่แสดงอาการ แต่คุณยังคงแพร่เชื้อได้

อาการต่าง ๆ จะหายไป แต่หากไม่ได้รับการรักษา โรคซิฟิลิสจะยังคงอยู่ในร่างกาย
และคุณสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้นานถึง 2 ปี นอกจากนี้
ยังอาจทำให้คุณป่วยหนักได้อีกด้วย

หากคุณเป็นโรคซิฟิลิสโดยไม่ได้รับการรักษาเป็นเวลานานกว่า 2 ปี (เรียกว่าระยะที่สาม)

โรคนี้สามารถส่งผลกระทบต่อสมอง หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ ไชสันหลัง ผิวหนัง และกระดูกได้
ซึ่งอาจนำไปสู่ความพิการและเสียชีวิตได้

โรคซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์

หากหญิงตั้งครรภ์เป็นโรคซิฟิลิส โรคนี้สามารถถ่ายทอดไปยังทารกในครรภ์และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
โรคนี้เรียกว่าโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด

หากตรวจพบโรคซิฟิลิสในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ ก็สามารถรักษาได้
ซึ่งจะช่วยลดอันตรายต่อทารกได้

หญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการตรวจหาโรคซิฟิลิสตั้งแต่เนิ่น ๆ และตรวจบ่อย ๆ ตลอดระยะเวลาคตั้งครรภ์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [โรคซิฟิลิสในระหว่างตั้งครรภ์](#)

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นโรคซิฟิลิส

ขอตรวจเลือดหาเชื้อซิฟิลิส

แพทย์ของคุณจะทำการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟิลิส อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาสั้น ๆ
หลังจากที่เชื้อซิฟิลิสเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการทดสอบ ดังนั้น
หากผลตรวจของคุณเป็นลบ คุณจะต้องทำการตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ควรตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น [คลาไมเดีย](#) [หนองใน](#) และ [เอชไอวี](#) ไปพร้อมกันด้วย

ค้นหาบริการตรวจเลือดหาเชื้อซิฟิลิสได้ที่ [Get the Facts \(เว็บไซต์ภายนอก\)](#)

ค้นหาสถานที่และเลือกตัวเลือก 'สุขภาพทางเพศ / การตั้งครรภ์ / เพศศึกษา'

โรคซิฟิลิสรักษาอย่างไร

การรักษาโรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสรักษาได้ด้วยยาเพนิซิลลินหรือยาปฏิชีวนะชนิดอื่น คุณต้องทานยาให้ครบตามหมอสั่ง
และไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

หลังการรักษา คุณจะต้องตรวจเลือดอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าหายขาดแล้ว

หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา

หากคุณเป็นโรคซิฟิลิสมานานกว่า 2 ปีและไม่ได้รับการรักษา โรคอาจส่งผลกระทบต่อ:

- สมอง
- หัวใจ
- หลอดเลือดขนาดใหญ่
- ไชสันหลัง
- ผิว
- กระดูก

ซึ่งอาจนำไปสู่ความพิการและเสียชีวิตได้

ขณะที่คุณยังมีเชื้ออยู่ในร่างกาย

เมื่อได้รับการวินิจฉัยยืนยันแล้ว ห้ามมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปาก แม้จะใช้ถุงยางอนามัยก็ตาม จนกว่าจะได้รับการรักษาครบตามกำหนด โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยเฉพาะในระยะแรกและระยะที่สอง

การติดตามผู้สัมผัส

แพทย์ของคุณควรพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการติดตามการสัมผัสโรคด้วย

หากคุณตรวจพบว่าติดเชื้อซิฟิลิส สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับคุณทราบ เพื่อให้แน่ใจว่า โรคซิฟิลิสจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขาและไม่แพร่เชื้อต่อไป หากบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับคุณไม่เข้ารับการรักษา คุณอาจติดเชื้อซิฟิลิสอีกครั้งได้

การติดตามผู้สัมผัสจะเกี่ยวข้องกับการค้นหาและแจ้งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อทราบ เพื่อให้พวกเขาสามารถรับคำปรึกษา การตรวจหาเชื้อ และการรักษาได้หากจำเป็น คุณสามารถติดตามผู้สัมผัสด้วยตนเองและ/หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ ปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์ของคุณ คุณยังสามารถใช้เว็บไซต์ Better To Know (เว็บไซต์ภายนอก) เพื่อแจ้งให้บุคคลที่เรามีเพศสัมพันธ์กับคุณทราบโดยไม่ต้องระบุชื่อของคุณได้

โรคซิฟิลิสสามารถป้องกันได้อย่างไร

- โดยการรับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำ
- โดยใช้ถุงยางอนามัยและ/หรือแผ่นยางอนามัย และสารหล่อลื่นชนิดน้ำทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
- พูดคุยกับบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับคุณเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ

จะขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน

- ไปพบแพทย์ทั่วไป (GP)
- โทรติดต่อ [healthdirect](#) ได้ที่หมายเลข 1800 022 222
- โทรติดต่อสายด่วนสุขภาพทางเพศ
 - ผู้โทรจากเขตเมือง: (08) 9227 6178
 - สำหรับผู้โทรจากต่างจังหวัด: 1800 198 205
- เยี่ยมชม [Healthysexual \(เว็บไซต์ภายนอก\)](#) เพื่อรับข้อมูลและตรวจหาเชื้อหนองในเทียมและหนองในแท้ทางออนไลน์ได้ฟรี
- ติดต่อ [คลินิกสุขภาพทางเพศในพื้นที่ของคุณ \(เว็บไซต์ภายนอก\)](#)

This document can be made available in alternative formats on request for a person with disability.

© Department of Health 2025

Copyright to this material is vested in the State of Western Australia unless otherwise indicated. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the provisions of the Copyright Act 1968, no part may be reproduced or re-used for any purposes whatsoever without written permission of the State of Western Australia.

health.wa.gov.au

Classification: Official