



# 10年级在校免疫接种计划 - 家长须知

## 什么是脑膜炎球菌病？

脑膜炎球菌病是一种不常见，但有时候会危及生命的疾病。这种疾病是由血液及/或脊髓和大脑周边的膜出现细菌感染而导致的。

尽管这种感染可以采用抗生素进行治疗，但其病情发展非常迅速，因此要注意，任何出现脑膜炎球菌病症状的人都应该立即就医。

在任何时候，大约百分之十的健康人士会在其鼻腔或喉咙处无害地携带脑膜炎球菌细菌，同时不会发病。

## 脑膜炎球菌病是如何传播的？

脑膜炎球菌细菌通过呼吸道分泌物传播（咳嗽、打喷嚏或接吻）。这种细菌在自然环境中只能生存几秒钟。

因此，这种疾病最可能只会传播给非常密切的接触者，例如居住在同一住所的人、性接触者以及在同一家日托设施连续逗留超过四个小时的儿童。

## 为什么西澳大利亚卫生部向10年级学生提供疫苗接种计划？

脑膜炎球菌病会影响任何年龄人群。不过，有些脑膜炎球菌携带率和发病率最高的人群是青少年，而这个年龄群体会将细菌传输给感染风险更高的人群，包括幼年儿童。

根据预计，为10年级学生进行免疫接种能减少细菌传输给其他人的机会，也能在更广泛的社区环境中帮助预防感染。

## 我需要做什么以确保我的孩子能够接种疫苗？

作为家长/监护人，您需要通过以下平台给与（接种）许可：

西澳疫苗接种（VaccinateWA）在线平台  
([vaccinatewa.health.wa.gov.au](http://vaccinatewa.health.wa.gov.au))\*

或者

通过

[healthywa.wa.gov.au/schoolimmunizations](http://healthywa.wa.gov.au/schoolimmunizations)

打印表格并将其交给学校

\*此选择不适用于位于君达乐市  
(City of Joondalup)

和圣诞节岛及科科斯群岛

(Christmas and Cocos Islands) 的学校。

## 将使用哪种疫苗？该疫苗的有效性有多高？

我们将使用脑膜炎球菌ACWY疫苗。这种疫苗能防御四个血清型的脑膜炎球菌：A、C、W和Y。本在校计划将使用的疫苗品牌为Nimenrix®。

这些疫苗都是安全、有效的。脑膜炎球菌ACWY疫苗方案自2015年起在英国年龄由13至15岁的青少年中实施，自2005年起在美国年龄由11至12岁的青少年中实施，至今没有出现重大关切问题的报告。常规情况下，该疫苗只需接种单剂次。对于罹患该疾病风险较高的人群，以及需求前往该疾病较常见地区的人群，建议追加剂次。相关研究显示，脑膜炎球菌ACWY疫苗在青少年中的有效性介于80%与85%之间。

## 谁不应接种这种疫苗？

如果属于以下情况，请告知提供注射疫苗的人：

- **您存在任何严重的、危及生命的过敏情况。**  
如果您之前接种脑膜炎球菌ACWY疫苗后曾出现危及生命的过敏反应，或者您对该疫苗的任何组成部分存在严重过敏，则不应接种此疫苗。接种供应方可以将该疫苗的成分告诉您。
- **您怀孕或正在采用母乳喂养。**  
常规情况下，我们不建议孕妇或采用母乳喂养的女性接种脑膜炎球菌疫苗，但是在出现临床指征时可以接种。如果您可能怀孕或者正在采用母乳喂养，请与您的GP做进一步的讨论。

## 这种疫苗有哪些副作用？

和任何药品（包括疫苗）一样，出现常见不良反应的可能性是存在的。这些反应通常较轻微，并且会自行消失。也有可能出现严重的反应，但非常罕见。疫苗导致严重损伤或死亡的可能性非常低。疫苗不会令您受到脑膜炎球菌感染。

常见不良反应包括注射针口位置出现疼痛、变红和肿胀、发烧、烦躁、胃口变差、头疼、皮疹和恶心。不过，严重的一般性不良反应十分罕见。

我们也对疫苗持续进行检查，确保疫苗安全、有效。如需获取有关疫苗安全以及常见和罕见副作用的信息，请浏览下列网站了解详情：

[healthywa.wa.gov.au/immunisation](https://healthywa.wa.gov.au/immunisation)



本文档可按要求提供备选格式，以供残障人士阅读。

传染性疾病预防管理局  
© Department of Health 2024

除非另有说明，本材料的版权由西澳大利亚州拥有。除根据《1968年版权法》的规定用于私人研究、调查、批评或评论目的的正当处理外，未经西澳大利亚州事先书面许可，不得为任何目的而复制或重新利用本材料的任何部分。

## 如果出现严重的反应该怎么办？我应注意哪些情况？

任何令您担忧的情况都需要注意，例如严重过敏反应的迹象、体温极高的发烧，或者不寻常的行为。严重过敏反应的迹象包括荨麻疹、面部和喉咙肿胀、呼吸困难、心跳加速、晕眩和无力，这通常会在接种疫苗后几分钟至几小时后出现。如出现任何严重反应，请召唤急救车或前往离您最近的急诊部。

## 我应该做什么？

扑热息痛可以帮助缓解轻微的发烧或疼痛，清凉的湿布也能减轻注射针口部位的疼痛。如果出现任何您认为是严重或意料之外的反应，请咨询医生或前往当地的急诊部。

或者拨打1800 022 222联系 **healthdirect Australia**。

根据法律的要求，所有在西澳大利亚的免疫接种供应商都需要报告免疫接种后出现的不良反应。对于在免疫接种后出现的任何严重反应，家长也可以将其担忧的问题加以汇报。请访问 [healthywa.wa.gov.au/WAVSS](https://healthywa.wa.gov.au/WAVSS) 或拨打6456 0208 了解更多信息。

## 联系方式

**您当地的医生、药剂师、社区卫生中心、医院或公共卫生单位**

[healthywa.wa.gov.au/publichealthunits](https://healthywa.wa.gov.au/publichealthunits)

**澳大利亚健康直通 (healthdirect)**

电话：1800 022 222

## 更多信息

**卫生部**

[healthywa.wa.gov.au/immunisation](https://healthywa.wa.gov.au/immunisation)

**联邦卫生部**

1800 671 811 或

[health.gov.au/health-topics/immunisation](https://health.gov.au/health-topics/immunisation)